Biforcazioni dei Sistemi Dinamici: Alcuni Esempi in Economia

José Carlos Valverde

Università di Castilla-La Mancha, SPAGNA.

17 Febbraio 2005, Macerata, ITALIA.

Introduzione

Introduzione

MOTIVAZIONE DELLO STUDIO DEI SISTEMI DINAMICI

L'obiettivo essenziale di un Sistema Dinamico è rappresentare un modello della realtà per poter estrarre conclusioni sul comportamento futuro di quello.

Introduzione

MOTIVAZIONE DELLO STUDIO DEI SISTEMI DINAMICI

Certamente, il grande interesse che svegliano i Sistemi Dinamici è dovuto senza dubbio a che una grande diversità di problemi delle Scienze come la Biología, la Física, la Química, l'Ingeniería o *l'Economia* possono essere rappresentati per equazioni alle differenze finite della forma

$$x_{n+1} = f(x_n) \quad \text{oppure} \quad (x_{n+1}, y_{n+1}) = f(x_n, y_n)$$

dove la non linearità della funzione continua f è di solito il più caratteristico

Introduzione

MOTIVAZIONE DELLO STUDIO DEI SISTEMI DINAMICI

È per tutto questo che sono diventati una delle più studiate aree non soltanto nell'ambito della Matematica, ma anche nell'ambito *dell'Economia*.

Introducción

CONTENUTI DEL SEMINARIO

- Generalità dei Sistemi Dinamici
- Biforcazioni dei Sistemi Dinamici
- Alcuni esempi in Economia
- Conclusioni
- Lavoro Futuro
- Bibliografia

Generalità dei Sistemi Dinamici

Generalità dei Sistemi Dinamici

Definizione. Un *sistema dinamico* è una terna (X, T, Φ) dove

X : Spazio metrico chiamato *spazio degli stati*,

T : Semigrupo additivo di $\mathbb{R}$ chiamato *insieme di tempi*,

Φ : Funzione continua chiamata *flusso* o *operatore di evoluzione*
e valgono le successive condizioni:

$$\Phi(0, x) = x \quad \forall x \in X, \text{ i.e., } \Phi_0(x) = id_X$$

$$\Phi(t, \Phi(s, x)) = \Phi(t + s, x) \quad \forall t, s \in T, \forall x \in X$$

Se l'insieme di tempi

$$T = \mathbb{Z} (\mathbb{N} \cup \{0\} \text{ o } \mathbb{Z}^- \cup \{0\}) \rightsquigarrow \textit{Sistema discreto}$$

Generalità dei Sistemi Dinamici

Un *sistema associato* a una funzione $f : X \rightarrow X$ continua, é il sistema (X, T, Φ) dato da

X : Spazio metrico

$T: \mathbb{N} \cup \{0\}$ (o $\mathbb{Z}$ quando si tratta di un homeomorfismo)

$\Phi: T \times X \rightarrow X$ con

$$\Phi(n, x) = \Phi_n(x) = f^n(x)$$

dove $f^0(x) = id_X$ y $f^n(x) = f(f^{n-1}(x))$, $n \geq 1$.

Generalità dei Sistemi Dinamici

Modelli unidimensionali

- *L'equazione logistica*

$$f(x, \mu) = \mu x(1 - x)$$

- *Il modello di May*

$$f(x, \mu) = \mu - x^2$$

- *Il modello di Ricker*

$$f(x, \mu) = \mu x e^{-x}$$

- *Un modello epidemiologico*

$$f(x, \mu) = (1 - x)(1 - e^{-\mu x})$$

Generalità dei Sistemi Dinamici

Modelli bidimensionali

- *L'equazione logistica ritardata,*

$$f(x, y; \mu) = (y, \mu y(1 - x))$$

- *Il modello preda-predatore discreto,*

$$f(x, y; \mu) = (\mu x(1 - x - y), \mu xy)$$

- *Il modello modello di Cournot*

$$F(x, y; \mu) = (f(y; \mu), g(x; \mu))$$

Generalità dei Sistemi Dinamici

Problemi Fondamentali nello studio dei Sistemi Dinamici

- È affidabile il modello?, i.e., risponde a quello che realmente succede?
- Con la funzione ottenuta, possiamo predire l'evoluzione per valori grandi di tempo?
- Riponderemo della stessa forma alle domande prime se sostituiamo quella f con un'altra un po' diversa. (Stabilità Strutturale).

Generalità dei Sistemi Dinamici

Definizione. Si dice che $(\mathbb{R}^m, f)$ è *localmente (topologicamente) coniugato* a $(\mathbb{R}^m, g)$ circa l'origine se esiste un homeomorfismo $h : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ definito in un intorno U di $x = 0$ del quale si abbia che $h(U) = V$ è un intorno di $y = 0$, che porta orbite del primo sistema in U a orbite del secondo sistema in V , mantenendo la direzione del tempo.

Generalità dei Sistemi Dinamici

Se consideriamo famiglie uniparametriche di funzioni definite in $\mathbb{R}^n$

$$f : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^n,$$

una *biforcazione locale* è l'apparizione di sistemi che non sono (localmente) topologicamente coniugati dentro alla famiglia quando muoviamo il parametro.

Ma, come possiamo sapere che c'è una biforcazione più facilmente?
Esamineremo alcuni concetti che ci aiuteranno.

Generalità dei Sistemi Dinamici

Sistema Dinamico Discreto associato a una funzione f

$$x \rightsquigarrow f(x), \quad x_{n+1} = f(x_n)$$

- (Forward)-Traiettoria

$$\{x_0, x_1 = f(x_0), x_2 = f(x_1) = f(f(x_0)) = f^2(x_0), \dots\}$$

- (Backward)-Traiettoria

$$\{x_0, x_{-1} = f^{-1}(x_0), x_{-2} = f^{-1}(x_{-1}) = f^{-2}(x_0), \dots\}$$

Non è unica se la funzione non è invertibile.

Generalità dei Sistemi Dinamici

Traiettorie importanti

- x_0 punto fisso

$$x_0 = f(x_0)$$

- x_0 punto n -periodico

$$x_0 = f(f(\dots f(x_0))) = f^n(x_0) \text{ ma anche } f^k(x_0) \neq x_0, k < n$$

Punti n -periodici sono punti fissi di f^n e possono essere studiati nello stesso modo

Generalità dei Sistemi Dinamici

Esempio. Se consideriamo la famiglia uniparametrica

$$f(x, \mu) = x + \mu - x^2$$

Generalità dei Sistemi Dinamici

In un intorno di $x = 0$:

- $\mu > 0 \rightsquigarrow f(x, \mu)$ ci sono due punti fissi.
- $\mu = 0 \rightsquigarrow f(x, \mu)$ c'è un punto fisso instabile.
- $\mu < 0 \rightsquigarrow f(x, \mu)$ non c'è nessun punto fisso.

Generalità dei Sistemi Dinamici

Stabilità dei punti fissi

Se x_0 è un punto fisso e $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ sono suoi autovalori e della matrice Jacobiana

- Se $|\lambda_i| < 1, \forall i = 1, 2, \dots, n$, allora x_0 è **stabile**.
- Se esiste λ_i che verifica $|\lambda_i| > 1$, allora x_0 è **instabile**.

Quindi, se gli autovalori hanno tutti valore assoluto diverso da 1 la stabilità può essere facilmente calcolata e si dice che x_0 è un **punto iperbolico**.

Generalità dei Sistemi Dinamici

Definizione. Si dice che un punto fisso x_0 è **non-iperbolico** se esiste qualunque autovalore λ_i tale che $|\lambda_i| = 1$.

- La stabilità non può essere facilmente calcolata, (eccetto nel caso che qualche λ_i sia tale che $|\lambda_i| > 1$)
- Infatti, qualunque intorno di x_0 , può avere
 - punti cui orbite si allontanano da $x_0 \rightsquigarrow$ (**Varietà stabile**)
 - punti cui orbite si avvicinano a $x_0 \rightsquigarrow$ (**Varietà instabile**)
- La sua presenza è condizione necessaria per una biforcazione locale (**Teorema di Hartman-Grobman**)

Generalità dei Sistemi Dinamici

Varietà Stabile, Instabile e Centrale

● Locale

- $W_{loc}^s = \{x \in U \mid f^h(x) \rightarrow x_0, h \rightarrow \infty, f^h(x) \in U, \forall h \geq 0\}$
- $W_{loc}^u = \{x \in U \mid f^{-h}(x) \rightarrow x_0, h \rightarrow \infty, f^{-h}(x) \in U, \forall h \geq 0\}$
- W_{loc}^c non si può definire in questo modo e non è sempre differenziabile

● Globale

- $W^s = \bigcup_{k \geq 0} f^{-k}(W_{loc}^s)$
- $W^u = \bigcup_{k \geq 0} f^k(W_{loc}^u)$
- W^c non si può definire in questo modo e non è sempre differenziabile

Biforcazioni dei Sistemi Dinamici

Biforcazioni dei Sistemi Dinamici

Le biforcazioni (locali) più importanti si basano sul cambio nella stabilità dei punti fissi oppure nel numero di punti fissi.

- Famiglie uniparametriche di sistemi unidimensionali:
 - Autovalore 1 $\Rightarrow$ Biforcazioni Fold, Transcritical e Pitchfork.
 - Autovalore -1 $\Rightarrow$ Biforcazione Flip.
- Famiglie uniparametriche di sistemi bidimensionali
 - Autovalori complessi coniugati $\Rightarrow$ Biforcazioni Neimark-Sacker.

Biforcazione Fold

La curva di punti fissi della famiglia è una parabola tangente al punto di biforcazione nel piano (x, μ) .

Biforcazione Fold

Teorema. (Classico) Sia $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ una famiglia uniparametrica, con f di classe C^2 , che presenta in $\mu_o = 0$ il punto fisso $x_o = 0$ con autovalore 1.

Supposto che la famiglia soddisfa le condizioni:

1. $f_{xx}(0, 0) \neq 0$
2. $f_{\mu}(0, 0) \neq 0$

Allora f presenta una biforcazione fold.

Biforcazione Fold

Teorema.(Nuovo) Sia $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ una famiglia uniparametrica, con f di classe C^{2n} , che presenta in $\mu_o = 0$ il punto fisso $x_o = 0$ e tale che $f_x(0, 0) = 1$.

Supposto che la famiglia soddisfa le condizioni:

1. $f_{xx}(0, 0) = f_{xxx}(0, 0) = \dots = f_{x^{2n-1}}(0, 0) = 0,$
 $f_{x^{2n}}(0, 0) \neq 0$
2. $f_{\mu}(0, 0) \neq 0$

Allora f presenta una biforcazione fold.

Biforcazione Fold

—DIAGRAMMI DI BIFORCAZIONE—

$$f_{x^{2n}}(0,0) > 0, f_{\mu}(0,0) > 0$$

$$f_{x^{2n}}(0,0) < 0, f_{\mu}(0,0) < 0$$

Biforcazione Fold

—DIAGRAMMI DI BIFORCAZIONE—

$$f_{xx}^{2n}(0, 0) < 0, f_{\mu}(0, 0) > 0$$

$$f_{xx}^{2n}(0, 0) > 0, f_{\mu}(0, 0) < 0$$

Biforcazione Transcritica

La famiglia ha due curve di punti fissi nel piano x, μ che passano per l'origine di detto piano e cambiano la stabilità dei punti fissi quando passano l'origine.

Biforcazione Transcritica

Teorema. (Classico) Sia $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ una famiglia uniparametrica, con f di classe C^2 , che presenta nella funzione corrispondente al valore parametrico $\mu_o = 0$ il punto fisso $x_o = 0$ e tale che $f_x(0, 0) = 1$.

Supposto che la famiglia soddisfa le condizioni:

1. $f_{xx}(0, 0) \neq 0$
2. $f_{x\mu}(0, 0) \neq 0$

Allora f presenta una biforcazione transcritica.

Biforcazione Transcritica

Teorema.(Nuovo) Sia $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ una famiglia uniparametrica, f di classe C^{2n+1} , che presenta nella funzione corrispondente al valore parametrico $\mu_o = 0$ il punto fisso $x_o = 0$ y tale che $f_x(0, 0) = 1$, $f_\mu(0, 0) = 0$.

Supposto che la famiglia soddisfa le condizioni:

1. $f_{xx}(0, 0) = f_{xxx}(0, 0) = \dots = f_{x^{2n-1}}(0, 0) = 0$,
 $f_{x^{2n}}(0, 0) \neq 0$
2. $f_{x\mu}(0, 0) \neq 0$

Allora f presenta una biforcazione transcritica.

Biforcazione Transcritica

—DIAGRAMMI DI BIFORCAZIONE—

Biforcazione Transcritica

—DIAGRAMMI DI BIFORCAZIONE—

Biforcazione Pitchfork

La famiglia ha due curve di punti fissi nel piano x, μ : una che passa per l'origine di detto piano e cambiano la stabilità dei punti fissi quando passano l'origine e altra che è tangente all'origine.

Biforcazione Pitchfork

Teorema. (Classico) Sia $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ una famiglia uniparametrica, con f di classe C^3 , dove le applicazioni sono dispari con rispetto a la variabile di stato, i.e., $f(-x, \mu) = -f(x, \mu)$ e tale che $f_x(0, 0) = 1$. Supposto che la famiglia soddisfa le condizioni:

1. $f_{xxx}(0, 0) \neq 0$
2. $f_{x\mu}(0, 0) \neq 0$

Allora f presenta una biforcazione pitchfork.

Biforcazione Pitchfork

Teorema.(Nuovo) Sia $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ una famiglia uniparametrica, con f di classe C^{2n+2} , che presenta nella funzione corrispondente al valore parametrico $\mu_o = 0$ il punto fisso $x_o = 0$, e tale che $f_x(0, 0) = 1$, $f_\mu(0, 0) = 0$.

Supposto che la famiglia soddisfa le condizioni:

1. $f_{xx}(0, 0) = f_{xxx}(0, 0) = \dots = f_{x^{2n}}(0, 0) = 0$,
 $f_{x^{2n+1}}(0, 0) \neq 0$
2. $f_{x\mu}(0, 0) \neq 0$

Allora f presenta una biforcazione pitchfork.

Biforcazione Pitchfork

—DIAGRAMMI DI BIFORCAZIONE—

$$f_{x^{2n+1}}(0,0) > 0, f_{x\mu}(0,0) > 0$$

$$f_{x^{2n+1}}(0,0) < 0, f_{x\mu}(0,0) < 0$$

Biforcazione Pitchfork

—DIAGRAMMI DI BIFORCAZIONE—

$$f_{x^{2n+1}}(0,0) < 0, f_{x\mu}(0,0) > 0$$

$$f_{x^{2n+1}}(0,0) > 0, f_{x\mu}(0,0) < 0$$

Biforcazione Flip

La famiglia ha due curve nel piano x, μ : una di punti fissi che passa per l'origine di detto piano e cambiano la stabilità dei punti fissi quando passano l'origine e altra di punti 2-periodici che è tangente all'origine.

Biforcazione Flip

Teorema. (Classico) Sia $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ una famiglia uniparametrica, con f di classe C^3 , che presenta in $\mu_o = 0$ il punto fisso $x_o = 0$ con autovalore -1 .

Supposto che la famiglia soddisfa le condizioni:

1. $f_{xxx}^2(0, 0) \neq 0$
2. $f_{x\mu}(0, 0) \neq 0$

Allora f presenta una biforcazione flip.

Biforcazione Flip

Teorema.(Nuovo) Sia $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ una famiglia uniparametrica, con f di classe C^{2n+1} , che presenta in $\mu_o = 0$ il punto fisso $x_o = 0$ e tale che $f_x(0, 0) = -1$.

Supposto che la famiglia soddisfa le condizioni:

1. $(f^2)_{xxx}(0, 0) = \dots = (f^2)_{x^{2n}}(0, 0) = 0,$
 $(f^2)_{x^{2n+1}}(0, 0) \neq 0$
2. $f_{x\mu}(0, 0) \neq 0$

Allora f presenta una biforcazione flip.

Biforcazione Flip

—DIAGRAMMI DI BIFORCAZIONE—

$$(f^2)_{x^{2n+1}}(0,0) > 0, f_{x\mu}(0,0) > 0 \quad (f^2)_{x^{2n+1}}(0,0) < 0, f_{x\mu}(0,0) < 0$$

Biforcazione Flip

—DIAGRAMMI DI BIFORCAZIONE—

$$(f^2)_{x^{2n+1}}(0,0) < 0, f_{x\mu}(0,0) > 0 \quad (f^2)_{x^{2n+1}}(0,0) > 0, f_{x\mu}(0,0) < 0$$

Biforcazione Neimark-Sacker

- Le funzioni del piano della famiglia $f(x, y; \mu)$ che presentano un punto fisso, presentano anche, dopo la biforcazione una curva invariante stabile oppure instabile.
- A differenza delle altre biforcazioni questa è una biforcazione del piano.
- La dinamica nella curva invariante è molto interessante.

Biforcazione Neimark-Sacker

Teorema. (Classico) Sia $f : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ una famiglia uniparametrica di funzioni del piano reale, f di classe C^6 , che verifica le seguenti condizioni in un intorno di $\mu = 0$:

1. $f(0, \mu) = 0$, i.e., $x = 0$ è un punto fisso per tutte le funzioni della famiglia in questo intorno.
2. $Df_x(0, \mu)$ ha autovalori complessi coniugati $\lambda(\mu)$ e $\overline{\lambda(\mu)}$ tali che per $\mu = 0$ suo modulo è $|\lambda(0)| = |\overline{\lambda(0)}| = 1$.
3. $\lambda = \lambda(0)$ non è radice m -ésima dell'unità per $m = 1, 2, 3, 4$.
(Condizione di non risonanza).
4. $\frac{d|\lambda(\mu)|}{d\mu}(0) > 0$.
(Condizione di Hopf).

Biforcazione Neimark-Sacker

Allora esiste un cambio di coordinate, differenziabile rispetto a μ , tale che

$$f(x, \mu) \sim g(z, \bar{z}, \mu) = \lambda(\mu)z + c(\mu)z^2\bar{z} + \mathcal{O}(|z|^4), \quad z, \bar{z} \in \mathbb{C}, \quad \mu \in \mathbb{R}$$

e poi esistono a, b, ϕ_0, ϕ_1 tali che, in coordinate polari, la immagine di ogni $(r, \theta; \mu)$ per f viene data come,

$$((1 + \mu)r - ar^3 + \mathcal{O}(\mu r^3, \mu^2 r, r^5), \theta + \phi_0 + \phi_1 \mu + br^2 + \mathcal{O}(\mu^2, \mu r^2, r^3))$$

Biforcazione Neimark-Sacker

- Se $a > 0$, la famiglia presenta una curva invariante e attrattiva per tutti i valori μ positivi sufficientemente piccoli.
- Se $a < 0$, la famiglia presenta una curva invariante e repulsiva per tutti i valori μ negativi sufficientemente piccoli.

Caso subcrítico ($a < 0$)

Caso supercrítico ($a > 0$)

Biforcazione Neimark-Sacker

Teorema.(Nuovo) Sia $f : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ una famiglia uniparametrica di funzioni del piano reale, con f di classe C^{2p+4} , che verifica le seguenti condizioni in un intorno di $\mu = 0$:

1. $f(0, \mu) = 0$, i.e., $x = 0$ è un punto fisso per tutte le funzioni della famiglia in questo intorno.
2. $Df_x(0, \mu)$ ha autovalori complessi coniugati $\lambda(\mu)$ e $\overline{\lambda(\mu)}$ tali che per $\mu = 0$ suo modulo è $|\lambda(0)| = |\overline{\lambda(0)}| = 1$.
3. $\lambda = \lambda(0)$ non è una radice m -ésima dell'unità per $m = 1, 2, 3, \dots, (2p + 2)$.
(Condizione di non risonanza)
4. $\frac{d|\lambda|}{d\mu}(0) \neq 0$
(Condizione di Hopf)

Biforcazione Neimark-Sacker

Allora esiste un cambio di coordinate, differenziabile rispetto a μ , tale che:

$$f(x, \mu) \sim \lambda(\mu)z + \sum_{m=1}^p c_{2m+1}(\mu)z^{m+1}\bar{z}^m + \mathcal{O}(|z|^{2p+2}),$$

$z \in \mathbb{C}$, $\mu \in \mathbb{R}$ e poi esistono $a_3, a_5, \dots, a_{2p+1}, b_2, b_4, \dots, b_{2p}, \phi_0, \phi_1$ tali che in coordinate polari l'immagine di ogni punto $(r, \theta; \mu)$ per f è

$$\left((1 + \mu)r - \sum_{m=1}^p a_{2m+1}r^{2m+1} + \mathcal{O}(|\mu r^3| + \mu^2|r| + r^{2p+2}), \right. \\ \left. \theta + \phi_0 + \phi_1\mu + \sum_{m=1}^p b_{2m}r^{2m} + \mathcal{O}(\mu^2 + |\mu|r^2 + |r|^{2p+1}) \right)$$

Biforcazione Neimark-Sacker

Se almeno uno dei a_{2m+1} è diverso da 0 e a_{2q+1} è il primo allora:

- Se $a_{2q+1} > 0$, $f(x, \mu)$ presenta una curva invariante e attrattiva per tutti i valori di μ positivi sufficientemente piccoli.
- Se $a_{2q+1} < 0$, $f(x, \mu)$ presenta una curva invariante e repulsiva per tutti i valori di μ negativi sufficientemente piccoli.

Biforcazione Neimark-Sacker

Dinamica sulla curva invariante

- Orbite quasiperiodiche dense o
- Un numero finito di orbite periodiche, che appaiono e poi scompaiono quando il parametro si muove

Biforcazione Neimark-Sacker

Come cambia la struttura delle orbite se il parametro si muove?

Abbiamo bisogno del *numero di rotazione* della funzione in la curva

$$\rho(f) = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\bar{f}(x) - x}{n} \right) \text{ mod } 1,$$

in media l'angolo di movimento nella curva

- $\rho(f) = p/q$ razionale se e solo se f c'è (non necessariamente unico) un punto di periodo q .
- $\rho(f)$ irrazionale allora f sulla curva invariante è topologicamente coniugata a una rotazione del circonferenza di angolo $2\pi\rho$ e poi tutte le orbite sono quasiperiodiche e dense.

Biforcazione Neimark-Sacker

L'applicazione sulla curva è strutturalmente stabile solo se ρ è razionale e esistono intervalli dove questo succede $\rightsquigarrow$ *Arnold Tongues*

Alcuni esempi in Economia

Alcuni esempi in Economia

Il modello originale di “Multiplier-Accelerator”

L'equazione

$$y_{t+1} = (a + c)y_t - ay_{t-1}, \quad 0 < c < 1, \quad 0 < a$$

che può essere riscritta come una funzione del piano data da

$$f(x, y) = ((a + c)x - ay, x)$$

oppure

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} a + c & -a \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Alcuni esempi in Economia

Il modello originale di “Multiplier-Accelerator”

Se $(a + c)^2 < 4a$, gli autovalori sono complessi coniugati $\lambda, \bar{\lambda}$ e verificano

- $|\lambda| = \sqrt{a}$

- $Arg(\lambda) = \arccos\left(\frac{a + c}{2\sqrt{a}}\right)$

Così se verificano le condizioni del teorema di Neimark-Sacker e possiamo sapere anche dove ci sono le Arnold Tongues.

Ma i modelli non sono di solito così semplici

Alcuni esempi in Economia

Il modello nonlinear di “Multiplier-Accelerator” di Hicks

L'equazione

$$y_{t+1} = cy_t + \max\{a(y_t - y_{t-1}), -D\}, \quad 0 < c < 1, \quad 0 < a, \quad 0 < D$$

che può essere riscritta come una funzione del piano data da

$$f(x, y) = \begin{cases} f_1(x, y) & y \leq x + D/a \\ f_2(x, y) & y > x + D/a \end{cases}$$

dove

$$f_1(x, y) = \begin{pmatrix} a + c & -a \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad f_2(x, y) = \begin{pmatrix} c & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -D \\ 0 \end{pmatrix}$$

Alcuni esempi in Economia

Il modello nonlinear di “Multiplier-Accelerator” di Hicks

- La funzione non è differenziabile e non possiamo applicare i teoremi primi.
- Però come nel caso differenziabile, il risultato della biforcazione è una curva invariante attrattiva homeomorfa alla circonferenza.
- Ma questa curva appare lontana dal punto e la sua posizione è dovuta alla retta critica.
- Sulla curva l'applicazione è una rotazione con numero di rotazione razionale o irrazionale.

Alcuni esempi in Economia

Il modello nonlinear di “Multiplier-Accelerator” di Hicks

Se $a = 1$ il punto fisso $(0, 0)$ è non-iperbolico e succede

- Numero di rotazione razionale $\Rightarrow$ poligono P invariante
 - Dentro al poligono, tutti i punti sono periodici.
 - Fuori dal poligono, tutti i punti arrivano in numero finito di iterazioni a un punto del poligono (eventualmente periodici)
- Numero di rotazione irrazionale $\Rightarrow$ regione invariante
 - Dentro alla regione, tutti i punti sono quasiperiodici.
 - Fuori dalla regione, tutti i punti arrivano in numero finito di iterazioni alla regione

Alcuni esempi in Economia

Il modello nonlinear di “Multiplier-Accelerator” di Hicks

Se $a > 1$ il punto fisso $(0, 0)$ è iperbolico e

- Se i parametri a, c sono nella regione di m/n -periodicità invariante
 - Due orbite periodiche nella curva, attrattiva e saddle .
 - La curva invariante è allora “made up” per i punti dell’insieme instabile del saddle che si avvicinano all’attrattivo.

Conclusioni

Conclusioni

- Conoscere la possibile biforcazione e soprattutto le orbite periodiche, può darci una preziosa informazione del sistema.
- Più differenziabilità permette a volte di conoscere se c'è una biforcazione.
- Più differenziabilità permette a volte di conoscere se c'è una forma normale di maggiore ordine.
- Ciò che succede per famiglie differenziabili può suggerire un'idea per famiglie non-differenziabili, ma non è niente sicuro.

Lavoro Futuro

Lavoro Futuro

Trovare condizioni sufficienti che permettano di sapere dell'esistenza delle biforcazioni di famiglie non-differenziabili.

Bibliografia

Bibliografia

1. F. Balibrea y J.C. Valverde [1999]. Bifurcations Under Non-degenerated Conditions of Higher Degree and a New Simple Proof of the Hopf-Neimark-Sacker Bifurcation Theorem, *J. Math. Anal. Appl.* **237**, 93-105.
2. F. Balibrea y J.C. Valverde [2001]. Structural Stability under Conditions of Non-Hyperbolicity. *Comput. Math. Appl.* **41**, 757-768.
3. F. Balibrea y J.C. Valverde [2000]. Extreme Degenerations for the Simplest Generic Bifurcations and New Transversally Conditions. Volumen especial agregato al **Volumen 6** di *Discrete and Continuous Time Dynamical Systems*, 22-30.

Biforcazioni dei Sistemi Dinamici: Alcuni Esempi in Economia

José Carlos Valverde

Università di Castilla-La Mancha, SPAGNA.

17 Febbraio 2005, Macerata, ITALIA.